


Módi ki bu ta Utiliza Es Kit di Naloxone



Faze kel Xamada.

Sta Priparadu pa Djuda

Na Rhode Island, Lei di Bon Samaritanu ta pruteje-bu di bai kadia óra ki bu djuda algen ki bu atxa ma sa ta ten un overdózi. Kel lei tanbe ta da pruteson pa kel algen ki tiver overdózi.

Bu pode sálva un vida .

Rikursus Adisional:

Si bo ô algen ki bu kre txeu sa ta pasan pa un krizi di uzu di substánsias ô di saúdi mental, ten rikursus 24 óra pa dia, 7 dia pa simana pa djuda.

Txoma Linha di Ajuda di BH Link pa **401-414-LINK (5465)** pa fala imediatamenti ku un konselheru di saúdi konpurtamental, ô bai na Séntru di Triaji di BH Link, na 975 Waterman Ave. na East Providence. Hablamos español

Vizita PreventOverdoseRI.org pa informason sobri sirvisus lokal di apoiu pa riduson di danus, trataméntu y rikuperason.

Fika ta Konxe Naloxone

Módi ki N ta sabe si N debe uza naloxone?

Si bu atxa ma algen sa ta ten un overdózi di opioidis, ka ta faze mal si bu da-l naloxone.

El ka ta riverte ifeitus di otus tipu di dróga sima alkol, xizalina ô stimulantis sima kokaína.

Naloxone pode ser prijudisial?

Ifeitus sikundáriu gravi di naloxone é mutu raru.

Ifeitu sikundáriu más kumun é abstinénsia di opioidis, pamódi naloxone ta invertir ifeitus di opioidis. Sintomas kumun di abstinénsia di opioidis ta inklui dor, iritabilidadi, sua txeu, naris ta pinga, diareia, náuzia, y vómitu.

Si bu atxa ma algen sa ta ten un overdózi, da-l naloxone. Pode salva-l di lezon serebral y mésmu di mórti.

Undi ki N ta atxa naloxone?

Bu pode kunpra un kit n-un farmásia lokal sén riseita, má pode ten un kó-pagaméntu, dipendendu di bu seguru. Pa sabe más, vizita preventoverdoseri.org/get-naloxone

Intende Overdózi

Módi ki N ta sabe si é un overdózi?

Pa invertir un overdózi, bu ten ki sabe el é módi.

Djobe kes sinal li:

Pupilas pikinóti y pontiagudu



Rispirason léntu y fraku



Inkonsiénsia y/ô sta sen rispósta



Si algen tiver un overdózi di opioidis y el dadu naloxone, el debe korda déntu di dos a três minutu.

Si el ka korda na três minutu ô el fika inkonsienti dipos di 30 - 90 minutu, da-l más un dózi di naloxone. Fika ku el ti ki ajuda txiga.

PREVENT OVERDOSE RI

09/09/2022

Módi ki bu ta Riaji a un Overdózi

1

Tenta korda kel algen



Txoma-l pa se nómi y sfrega-l na meu di petu ku mon fitxadu.

2

Txoma pa 911



Rhode Island Good Samaritan Law (Lei di Bon Samaritanu di Rhode Island) ta oferese un sértu proteson juridiku óras ki bu txoma pa 911 óras ki un algen sofre un overdózi, si bu tene dróga ku bo ô nau.

- Da lokalizason izátu di midjor fórma ki bu konsigi.
- Fla si kel algen sta konsienti (kordádu) ô nau.
- Fla si respirason di kel algen branda ô pára.

3

Da-l naloksona

(Na rótulu pode sta "Narcan.")



Sigi orientasons di kits di naloksona nazal ô instramuskular. Efeito di naloksona normalmenti ta para dentu di 30 a 90 minotu.

4

Apoi u respiratóriu



- Si kel algen volta respira di nóvu, mas inda el stiver sedádu, el ka meste dadu más naloksona. Si kel algen ka sta ta respira, rializa respirason di risgáti y kumesa faze CPR (RKP- risusitason kardiopulmunar) konfórmi 911 orientá-bu.
- Kalka na si petu ku forsa y di fórma rápidu na rítimu di múzika "Stayin' Alive".
- Sta preparadu pa da-l un sigundu dózi di naloksona.
- Kazu kel algen inda ka volta respira dispôs di 2-3 minotu, da-l un sigundu dózi di naloksona.

5

Puzison di rikuperason



Bira kel algen di ladu na puzison di rikuperason ku se korpu apoiádu na un djuedju dobrádu. Kela ta djuda-l mante vias respiratóriu abértu y ka bu dexa-l foga kazu el vumita.

PREVENT OVERDOSE RI 

