

Cómo reconocer una sobredosis

Signos comunes para tener en cuenta

Respiración lenta

Una persona puede estar respirando lenta y superficialmente, hacer ruidos de gorgoteo o dejar de respirar.



Problemas para despertarse o mantenerse inerte

Una persona puede estar despierta, pero puede no hablar o puede no responder cuando intentan despertarla.



Cambios en el tono de la piel

Su tono de piel puede volverse de grisáceo o ceniciento a púrpura azulado.



¿Qué es lo siguiente que debe hacer?

Llamar al 911, administrarle naloxona y apoye la respiración si la persona no responde.

Para obtener más información y recursos sobre cómo reconocer una sobredosis, visite PreventOverdoseRI.org/respond

PREVENT OVERDOSE RI

Cómo reconocer una sobredosis

Signos comunes para tener en cuenta

Respiración lenta

Una persona puede estar respirando lenta y superficialmente, hacer ruidos de gorgoteo o dejar de respirar.



Problemas para despertarse o mantenerse inerte

Una persona puede estar despierta, pero puede no hablar o puede no responder cuando intentan despertarla.



Cambios en el tono de la piel

Su tono de piel puede volverse de grisáceo o ceniciento a púrpura azulado.



¿Qué es lo siguiente que debe hacer?

Llamar al 911, administrarle naloxona y apoye la respiración si la persona no responde.

Para obtener más información y recursos sobre cómo reconocer una sobredosis, visite PreventOverdoseRI.org/respond

PREVENT OVERDOSE RI

Cómo reconocer una sobredosis

Signos comunes para tener en cuenta

Respiración lenta

Una persona puede estar respirando lenta y superficialmente, hacer ruidos de gorgoteo o dejar de respirar.



Problemas para despertarse o mantenerse inerte

Una persona puede estar despierta, pero puede no hablar o puede no responder cuando intentan despertarla.



Cambios en el tono de la piel

Su tono de piel puede volverse de grisáceo o ceniciento a púrpura azulado.



¿Qué es lo siguiente que debe hacer?

Llamar al 911, administrarle naloxona y apoye la respiración si la persona no responde.

Para obtener más información y recursos sobre cómo reconocer una sobredosis, visite PreventOverdoseRI.org/respond

PREVENT OVERDOSE RI

Cómo reconocer una sobredosis

Signos comunes para tener en cuenta

Respiración lenta

Una persona puede estar respirando lenta y superficialmente, hacer ruidos de gorgoteo o dejar de respirar.



Problemas para despertarse o mantenerse inerte

Una persona puede estar despierta, pero puede no hablar o puede no responder cuando intentan despertarla.



Cambios en el tono de la piel

Su tono de piel puede volverse de grisáceo o ceniciento a púrpura azulado.



¿Qué es lo siguiente que debe hacer?

Llamar al 911, administrarle naloxona y apoye la respiración si la persona no responde.

Para obtener más información y recursos sobre cómo reconocer una sobredosis, visite PreventOverdoseRI.org/respond

PREVENT OVERDOSE RI

Cómo responder a una sobredosis

Compruebe el estado de conciencia

Llámele por su nombre y frote el centro del pecho con el puño cerrado.



Llame al 911

La Ley del Buen Samaritano brinda cierta protección legal, ya sea que tenga con usted drogas o no.



Administre naloxona

Siga las instrucciones en el paquete de naloxona nasal o intramuscular.



Apoyo para la respiración

Si la persona está respirando nuevamente pero aún está sedada, no necesita más naloxona. Si la persona no está respirando, inicie la RCP (Resucitación artificial) según las indicaciones del 911.



Posición de recuperación

Si no puede quedarse a esperar la ayuda o si se restablece la respiración, coloque a la persona de lado con el apoyo de una rodilla doblada.



Para obtener más información y recursos sobre cómo reconocer una sobredosis, visite PreventOverdoseRI.org/respond

PREVENT OVERDOSE RI 

Cómo responder a una sobredosis

Compruebe el estado de conciencia

Llámele por su nombre y frote el centro del pecho con el puño cerrado.



Llame al 911

La Ley del Buen Samaritano brinda cierta protección legal, ya sea que tenga con usted drogas o no.



Administre naloxona

Siga las instrucciones en el paquete de naloxona nasal o intramuscular.



Apoyo para la respiración

Si la persona está respirando nuevamente pero aún está sedada, no necesita más naloxona. Si la persona no está respirando, inicie la RCP (Resucitación artificial) según las indicaciones del 911.



Posición de recuperación

Si no puede quedarse a esperar la ayuda o si se restablece la respiración, coloque a la persona de lado con el apoyo de una rodilla doblada.



Para obtener más información y recursos sobre cómo reconocer una sobredosis, visite PreventOverdoseRI.org/respond

PREVENT OVERDOSE RI 

Cómo responder a una sobredosis

Compruebe el estado de conciencia

Llámele por su nombre y frote el centro del pecho con el puño cerrado.



Llame al 911

La Ley del Buen Samaritano brinda cierta protección legal, ya sea que tenga con usted drogas o no.



Administre naloxona

Siga las instrucciones en el paquete de naloxona nasal o intramuscular.



Apoyo para la respiración

Si la persona está respirando nuevamente pero aún está sedada, no necesita más naloxona. Si la persona no está respirando, inicie la RCP (Resucitación artificial) según las indicaciones del 911.



Posición de recuperación

Si no puede quedarse a esperar la ayuda o si se restablece la respiración, coloque a la persona de lado con el apoyo de una rodilla doblada.



Para obtener más información y recursos sobre cómo reconocer una sobredosis, visite PreventOverdoseRI.org/respond

PREVENT OVERDOSE RI 

Cómo responder a una sobredosis

Compruebe el estado de conciencia

Llámele por su nombre y frote el centro del pecho con el puño cerrado.



Llame al 911

La Ley del Buen Samaritano brinda cierta protección legal, ya sea que tenga con usted drogas o no.



Administre naloxona

Siga las instrucciones en el paquete de naloxona nasal o intramuscular.



Apoyo para la respiración

Si la persona está respirando nuevamente pero aún está sedada, no necesita más naloxona. Si la persona no está respirando, inicie la RCP (Resucitación artificial) según las indicaciones del 911.



Posición de recuperación

Si no puede quedarse a esperar la ayuda o si se restablece la respiración, coloque a la persona de lado con el apoyo de una rodilla doblada.



Para obtener más información y recursos sobre cómo reconocer una sobredosis, visite PreventOverdoseRI.org/respond

PREVENT OVERDOSE RI 