



Vacuna contra la viruela símica (*mpox* en inglés) (vacuna JYNNEOS)



La viruela símica o *mpox* en inglés (previamente conocida como viruela del mono) es causada por un virus estrechamente relacionado con el virus que causa la viruela. JYNNEOS es una vacuna de 2 dosis que se elaboró para proteger tanto contra la viruela símica como contra la viruela. La vacunación es una herramienta importante para prevenir la propagación de la viruela símica. Sin embargo, las personas que están vacunadas deberían continuar evitando el contacto cercano, de piel a piel, con alguien que tenga viruela símica.

Usted debería considerar vacunarse en las siguientes situaciones:

- Si es hombre gay, bisexual u otro hombre que tiene relaciones sexuales con hombres, o una persona transgénero, no binaria o de género diverso que en los últimos 6 meses ha tenido...
- Un diagnóstico nuevo de una o más enfermedades de transmisión sexual (como la infección por el VIH, chancroide, clamidia, gonorrea o sífilis).
 - » Más de una pareja sexual.
- En los últimos 6 meses, usted:
 - » Tuvo relaciones sexuales en un sitio comercial (como un club sexual o una casa de baños).
 - » Tuvo relaciones sexuales en un evento, sitio o área (ciudad o condado, por ejemplo) donde había transmisión de viruela símica.
- Tiene una pareja sexual que se identifica con alguna de las situaciones anteriores.
- Anticipa que se verá en alguna de las situaciones anteriores.
- Trabaja con ortopoxvirus en un laboratorio o forma parte de un equipo de trabajadores de atención médica de respuesta a ortopoxvirus.

Usted debería vacunarse en las siguientes situaciones:

- Tuvo una exposición o presunta exposición a alguien con la viruela símica.
- Tuvo una pareja sexual en la últimas dos semanas, que recibió un diagnóstico de viruela símica.

- Usted es un hombre gay, bisexual u otro hombre que tiene relaciones sexuales con hombres, o una persona transgénero, no binaria o de género diverso que en las últimas 2 semanas ha tenido...
 - » Relaciones sexuales con múltiples parejas o en grupo
 - » Relaciones sexuales en un sitio comercial (como un club sexual o una casa de baños)
 - » Relaciones sexuales en un evento, sitio o área (ciudad o condado, por ejemplo) donde haya transmisión de viruela símica.

Usted NO debería vacunarse si:

- Tuvo una reacción alérgica grave (como anafilaxia) después de su primera dosis de la vacuna JYNNEOS.
- Hable con su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de reacción alérgica a los antibióticos gentamicina o ciprofloxacina, o a las proteínas de los huevos o de los pollos.

Usted debería tomar precauciones extra si:

- Tiene antecedentes de reacción alérgica a las vacunas en general. De todos modos puede ponerse la vacuna JYNNEOS, pero puede que su proveedor deba vigilarlo por 30 minutos después de aplicarle la vacuna para asegurarse de que no presente una reacción alérgica.

