

## ព័ត៌មានសំរាប់អ្នកជំងឺ



### តើថ្នាំបង្ការកុំឱ្យមានកូនជាបន្ទាន់អាសន្ន (EC) ?

- ◆ ថ្នាំ EC (ហៅម្ខាងទៀតថាថ្នាំក្រោយពេលព្រឹក) គឺជាថ្នាំការពារមិនឱ្យមានកូន ជាបន្ទាន់អាសន្ន ។
- ◆ អ្នកគួរតែប្រើវា បើសិនជាអ្នកបានសេពសន្ទុះ ហើយ៖
  - បានប្រើថ្នាំការពារមិនឱ្យមានកូនប្រភេទណាមួយ;
  - បានប្រើស្រោមអនាម័យដែលធ្លាយ; ឬ
  - ភ្លេចមិនបានលេបថ្នាំការពារមិនឱ្យមានកូន 2 ដងឬលើសក្នុងខែនេះ ។

### តើខ្ញុំអាចទទួលបានថ្នាំ EC នៅទីណា?

- ◆ អ្នកអាចទទួលបានថ្នាំ EC ពីអ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាពឬ ឱសថស្ថានណាមួយ ។
- ◆ បើសិនជាអ្នកមានអាយុលើស 17 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាទេ ។
- ◆ ថ្នាំ EC គឺមានសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពទោះជាអាយុបុគ្គលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ បើសិនជាអ្នកមានអាយុក្រោម 17 ឆ្នាំ អ្នកត្រូវតែមានសំបុត្រវេជ្ជបញ្ជា ។

### តើមានការណែនាំអ្វីខ្លះសំរាប់ការប្រើថ្នាំ EC?

- ◆ ថ្នាំ Plan B<sup>®</sup> និង Next Choice<sup>™</sup>: លេបមួយគ្រាប់ភ្លាម; រួចលេប គ្រាប់ទីពីរ 12 ម៉ោងក្រោយមក ។
- ◆ ថ្នាំ Plan B<sup>®</sup> One-Step: លេបមួយគ្រាប់ភ្លាម ។

### តើខ្ញុំគួរតែលេបថ្នាំ EC ពេលណា?

- ◆ ថ្នាំ EC មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត បើអ្នកប្រើវា ក្នុងរវាង 3 ថ្ងៃ ក្រោយពីបានសេពសន្ទុះដោយគ្មានការការពារ ។
- ◆ ថ្នាំ EC មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់រយៈពេល 5 ថ្ងៃក្រោយពីបានសេពសន្ទុះដោយគ្មានការការពារ ។
- ◆ ថ្នាំ EC នឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេក្រោយពីរយៈពេល 5 ថ្ងៃ ។

### តើថ្នាំ EC មានប្រសិទ្ធភាពរបៀបណា?

- ◆ ថ្នាំ EC មានជាតិអ័រម៉ូនដូចគ្នាដែលមានប្រើនៅក្នុងថ្នាំការពារមិនឱ្យមានកូនធម្មតា ។
- ◆ ថ្នាំ EC គឺមិនមែនជាថ្នាំសំរាប់រំលូតកូនទេ ។ ថ្នាំនេះគឺការពារមិនឱ្យមានកូន ។ វាមិនបញ្ឈប់ ហើយមិនមានប៉ះពាល់ដល់ភ័ក្តិ ដែលកំពុងតែមាននោះទេ ។

### តើនរណាមិនគួរប្រើថ្នាំ EC ?

- ◆ គេមិនគួរប្រើថ្នាំ EC ទេ បើសិនជា៖
  - អ្នកមានគភ៌ព្រោះថ្នាំនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ;
  - អ្នកមានប្រតិកម្មជាតិអ័រម៉ូននៅក្នុងថ្នាំការពារមិនឱ្យមានកូន ។

### តើផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែលខ្ញុំនឹងមានពីការប្រើថ្នាំ EC?

- ◆ អ្នកប្រហែលមានការក្អកក្អាយ ឈឺក្រពះ ឈឺក្បាលឬវិលមុខ ។
- ◆ អ្នកប្រហែលធ្លាក់ឈាមតិចៗ (spotting) មុនពេលអ្នកមានរដូវ ឬធ្លាក់ឈាមនៅពេលធ្លាក់រដូវលើកក្រោយ ។

### តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ក្រោយពីខ្ញុំលេបថ្នាំ EC?

- ◆ បន្តប្រើថ្នាំការពារមិនឱ្យមានកូនធម្មតារបស់អ្នក ឬចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំ ការពារមិនឱ្យមានកូន ។
- ◆ និយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតណាម្នាក់អំពីជម្រើសនៃការប្រើថ្នាំការពារ មិនឱ្យមានកូនរបស់អ្នក ។
- ◆ បើសិនជាអ្នកមានមករដូវក្នុងរវាងពីអាទិត្យចាប់ពីពេលប្រើថ្នាំ EC អ្នកគួរតែធ្វើតេស្តអំពីការមានគភ៌ ។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ទូរស័ព្ទមកលេខ៖

[www.mynextchoice.com](http://www.mynextchoice.com) ឬ 1-866-992-8766

[www.planbonestep.com](http://www.planbonestep.com) ឬ 1-800-330-1271

ថវិការដ្ឋានឧបត្ថម្ភសំរាប់ការបោះពុម្ព និងចែករំលែកឯកសារនេះបានផ្តល់ដោយថវិការដ្ឋានអប់រំពីអង្គការស្រាវជ្រាវ **DURAmEd Research, Inc.**, ផែនការសុខភាព **Neighborhood Health Plan** នៃរដ្ឋ **RI** និង **UnitedHealthcare**