

ប្រតិកម្មចំណីអាហារ

របៀបសម្គាល់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងករណីប្រតិកម្មចំណីអាហារសង្ស័យ និងសកម្ម (ប្រតិកម្មខ្លាំង)

សម្រាប់មួយ ឬច្រើនក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាសំខាន់ៗខាងក្រោម៖



សួត

ដង្ហើយខ្លី ដង្ហើមតឹង ក្អកច្រើនដង



បេដូង

ស្លេក ខៀវ ខ្សោយ ជីបចរខ្សោយ ជិងជោង



បំពង់ក

តឹង ស្លុក ដង្ហើមទាក់ៗ ឬលេបទឹកមាត់



មាត់

ហើមអណ្តាត បបូរមាត់



ស្បែក

ឡើងកន្ទួលច្រើនលើ ដងខ្លួន ឡើងក្រហម ច្រើនកន្លែង



ពោះវៀន

ក្អកច្រើនដង រាគខ្លាំង



ផ្សេងៗ

អារម្មណ៍មិនល្អចំពោះអ្វីមួយជិតកើតឡើង ដូចជាខឹង ឬរង្វេងវង្វាន់

1 ទូរស័ព្ទទៅ 911

ស្នើសុំជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដោយមានថ្នាំ epinephrine

2 ដាក់អ្នកជំងឺឲ្យដេកលើកដើងឡើងលើ

ប្រសិនបើពួកគេកំពុងក្អក ឬពិបាកដង្ហើម ឲ្យក្បួនគេអង្គុយ ឬទម្រេតទៅម្ខាង។

3 ជំហានបន្ទាប់

ដឹកទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ (ER)។ អ្នកជំងឺគួរតែស្នាក់នៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់រយៈពេល 4 ម៉ោង ដោយសារតែរោគសញ្ញាអាចកើតឡើងមកវិញ។

មានរោគសញ្ញាស្រាលនៃករណីប្រតិកម្មចំណីអាហារ៖



ច្រមុះ

រមាស់ ឬហាសំបោរ កន្តាស



មាត់

រមាស់មាត់



ស្បែក

កន្ទួលតិចៗ រមាស់តិចៗ



ពោះវៀន

ចង់ក្អកតិចៗ ឬមិនស្រួលក្នុងខ្លួន



ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណីអាហារ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ (401) 222-2750

ដកស្រង់ចេញពីបណ្តាញការពារ ប្រតិកម្មចំណីអាហារទូទៅ និង ប្រតិកម្មសកម្ម ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017